

## การเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ PD Leakage ด้วยวิธี CT with contrast

1. เมื่อแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย PD ส่ง CT with contrast เพื่อตรวจ PD leakage ให้พยาบาล PD ส่งนัดกับแผนก CT และสอบถามผู้ป่วยเรื่องการแพ้อาหารทะเล ถ้าผู้ป่วยมีประวัติการแพ้อาหารทะเลให้แจ้งแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทราบ
2. เมื่อได้กำหนดวัน CT ให้ส่ง contrast media ชื่อ.....เพื่อใช้ผสมใน PDF
3. นัดผู้ป่วยให้มาในวันทำ CT ตอน ..... น. โดยผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหาร (NPO) ตามหลักเกณฑ์การทำ CT และให้ผู้ป่วยปล่อยน้ำยา PDF ออกจนหมดโดยไม่ต้องใส่น้ำยาเข้าช่องท้อง (ปล่อยให้ท้องแข็ง) แล้วไปแผนก CT เพื่อทำ CT plain film เมื่อผู้ป่วยทำ CT plain film เสร็จแล้วให้ขึ้นมาห้อง PD เพื่อพบพยาบาล PD เพื่อใส่ PDF ที่ผสม contrast media .....
4. พยาบาล PD ผสม contrast media ..... ซีซีต่อ PDF 2000 cc (ยกเว้นในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อการใส่น้ำยา PDF 2000 cc ในช่องท้องได้ ให้ใช้ PDF 1000 cc โดยใช้ contrast media..... ซีซี) แล้วใส่ในช่องท้องผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยเดินไปมา 1 ชั่วโมง แล้วส่ง CT ใหม่ (โดยทั่วไปจะทำ CT หลังใส่ contrast media ชั่วโมงที่ 2 และ 4 ในกรณีที่เห็นรอยรั่วที่ 2 ชั่วโมงสามารถพิจารณายกเลิกทำ CT หลังใส่ contrast media ที่ 4 ชั่วโมงได้)
5. เมื่อผู้ป่วยทำ CT with contrast เสร็จแล้ว ให้ขึ้นมาที่ห้อง PD เพื่อปล่อยน้ำยา PD with contrast ออก แล้วทำ PD with dwell time 1 ชั่วโมง 2 รอบติดต่อกัน จากนั้นให้ผู้ป่วยกลับบ้านทำ PD ตามปกติ นัดผู้ป่วยมาฟังผลการตรวจ CT โดยพยาบาล PD สอบถามวันที่ได้ผลจากแผนก CT

**หมายเหตุ:** Contrast media ใช้เป็น nonionic contrast media ขนาด 30-50 ซีซี/ PDF 1 ลิตร โดยที่ nonionic contrast media มีปริมาณ iodine 300 มิลลิกรัม/ซีซีของ contrast media